

PREPARACION DE COLONOSCOPIA CON ENDOFALK

Estimado Paciente:

Dada su condición médica particular (insuficiencia renal, hemodializado, o con Hipertensión arterial severa), debe realizar una preparación adicional para el procedimiento de Colonoscopia. Esta consiste en reemplazar el uso de **Fleet Fosfosoda** por el medicamento **ENDOFALK** y seguir las instrucciones a continuación.

DEBE CONSUMIR TODOS LOS SOBRES QUE VIENEN EN EL ENVASE

- Debe disponer de agua hervida y fría
- La dosis a administrar para lograr una adecuada limpieza intestinal debe ser de 6 sobres disueltos en 3 litros de agua hervida y fría.

EL DIA ANTES DEL EXAMEN

- Los primeros 3 sobres se disuelven en 1,5 L de agua (hervida y fría) y se toman a las 16:00 pm del día anterior a la Colonoscopia tomando al menos cuatro (4) vasos de agua de 250 ml aproximadamente o más, de líquidos claros.
- Los 3 sobres adicionales se disuelven en 1,5 L de agua (hervida y fría) y se toman entre las 20:00 pm y 22:00 pm, tomando al menos cuatro (4) vasos de agua de 250 ml aproximadamente o más, de líquidos claros.

PACIENTE HEMODIALIZADO

- Tomar 1½ (un litro y medio) 2 (dos) horas después de terminada la sesión de diálisis y el otro 1 ½ (litro y medio) el mismo día del examen a las 07:00 hrs (am).

NOTA: En este proceso durante la noche, puede dormir de manera normal, si se despierta en este periodo, debe tomar al menos un vaso de agua antes de volver a dormir.

Es **MUY IMPORTANTE** que luego de tomar la última dosis del preparado continúe tomando **ABUNDANTE AGUA** hasta al menos **1 hora antes del examen**